



Ühe minuti
õppimine
Nr 20

ENNE OPERATSIOONI LOOBU SUITSETAMISEST

VÄLDI TÛSISTUSI JA PARANE KIIREMINI

Suitsetamine enne operatsiooni suurendab TÛSISTUSTE riski 40%



SÛDAMEINFARKT

↑risk 80%

SÛDAMESEISKUS

↑risk 57%




INSULT

↑risk 73%



ELUOHTLIK SEISUND

↑risk 38%



KOPSUPÕLETIK JA -TÛSISTUSED

↑risk 109%



**OPERATSIOONI HAAVA PÕLETIK
JA SOOLE LAHTIMINEK**

↑risk 30%



SEPSIS (RASKE INFEKTSIOON)

↑risk 30-55%

Varem LOOBUDES on KASU suurem



Paraneb hapniku transport
Langeb vererõhk ja südame
löögisagedus



Kiirem haava paranemine ja
vähem tÛsistusi



Parem kopsufunktsioon
KopsutÛsistuste risk
↓25-50%

ROHKEM
INFOT



Tule TASUTA nõustamisele!

Registruur 5 või helista 617 2060

SAATEKIRJA ei ole vaja!

Operatsioonieelse nõustamisega õnnestub
suitsetamisest loobumine
10 korda suurema tõenäosusega

REGISTREERI
NÕUSTAMISELE

