

КНИЗАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Конизация шейки матки — это хирургический метод диагностики и лечения, в ходе которого проводится частичное удаление ткани шейки матки, если в ней были обнаружены атипичные эпителиальные клетки. Удаляемый образец ткани обычно имеет форму конуса, поэтому сама процедура называется конизацией.

В большинстве случаев изменения в эпителии шейки матки вызваны вирусом папилломы человека. Некоторые виды вируса папилломы являются более опасными и значительно чаще вызывают развитие рака шейки матки. Удаленная в ходе процедуры часть шейки матки отправляется на гистологическое исследование.

Перед процедурой:

- перед тем как направить пациентку на процедуру конизации, проводится ряд исследований для определения того, являются ли изменения в эпителиальных клетках на поверхности шейки матки настолько серьезными, чтобы необходимо было удалять часть шейки матки с измененными клетками:
 - с поверхности канала шейки матки путем соскоба берется мазок для пробы (онкоцитологический препарат);
 - кольпоскопия — участок шейки матки, в котором имеются изменения, изучается с помощью микроскопа, а при необходимости отщипывают образцы ткани;
 - при необходимости проводится анализ на наличие инфекции, вызванной вирусом папилломы человека;
- конизация шейки матки обычно проводится под общей анестезией. За 6 часов до проведения процедуры ничего не ешьте и не пейте. Также нельзя жевать жевательную резинку и курить, чтобы избежать рвоты и попадания кислотного содержимого желудка в дыхательные пути и в легкие. При желании процедуру можно провести также и под местной анестезией;
- для снижения риска осложнений проинформируйте врача о следующем:
 - имеющиеся у Вас заболевания и принимаемые лекарственные препараты (в день операции можно принимать только те лекарства, которые разрешит лечащий врач или анестезиолог);
 - состояние здоровья в момент прибытия для операции (например, наличие вирусной инфекции);
 - наличие повышенной чувствительности к лекарственным препаратам.

Во время процедуры:

- обычно процедура проводится в отделении дневной хирургии;
- Вам будет проведена кратковременная общая анестезия или местное обезболивание;
- часть шейки матки будет удалена;
- кровотечение на поверхности шейки матки будет остановлено посредством наложения швов или диатермокоагуляции, а во влагалище при необходимости будет помещен тампон.

После процедуры:

- при хорошем самочувствии Вас отправят домой после того, как полностью пройдет действие наркоза;
- лекарства, используемые при анестезии, замедляют скорость реакции, поэтому в течение 24 часов после наркоза Вам нельзя будет водить машину;
- результаты гистологического исследования направят Вашему врачу;
- в течение 2–4 недель может отмечаться незначительное кровотечение, а также обильные водянистые выделения. При обильном кровотечении, повышении температуры или болях в животе немедленно обратитесь к врачу;
- в течение 4–6 недель избегайте половых контактов, а также тяжелой физической работы и поднятия тяжестей;
- не рекомендуется принимать ванну или плавать;
- в течение 4–6 недель после проведения процедуры не используйте влагалищные тампоны (даже во время менструации);

Возможные осложнения:

- кровотечение из раны в шейке матки, которое может потребовать наложения швов или коагуляции («прижигания»);
- после конизации может минимально увеличиться риск недостаточности шейки матки, что в свою очередь может привести к осложнениям во время беременности - выкидышу и преждевременным родам. Недостаточность шейки матки можно скорректировать в ходе беременности с помощью укрепляющего шейку матки шва. Обычно после этой процедуры беременность протекает нормально;
- в редких случаях возникает воспаление шейки матки или воспаление самой матки, которое обычно лечат антибактериальными препаратами;
- в крайне редких случаях повреждаются органы, находящиеся в непосредственной близости от шейки матки (мочеточник, мочевого пузыря, матка);
- осложнения после анестезии могут быть связаны с аллергией к лекарственным препаратам, а также с игнорированием требования о воздержании от приема пищи и жидкостей перед анестезией (это может стать причиной рвоты и попадания рвотных масс в дыхательные пути с последующим удушьем).

Информационный лист составлен Центром гинекологических заболеваний (2018).

Северо-Эстонская региональная больница

ул. Ю. Сютисте теэ, 19

13419 ТАЛЛИНН

www.regionaalhaigla.ee