Regionaalhaigla

Infektsioonid ja nende ravi hematoloogilistel haigetel

Mait Altmets

Immuunpuudulikkuse põhjused

Neutropeenia on olulisim riskifaktor infektsioonide tekkes kasvajaga haigel

- keemiaravi tüsistus
- põhihaigusest tingitud
- muud kasutatavad ravimid



Regionaalhaigla

Infektsioonikahtlusega patsient

Mida arvestada enne uuringute ja ravi alustamist?

1. põhihaigus ja selle staadium
2. eelnev ravi
3. neutropeenia
4. resistentsed tekitajad
5. tsentraalse veenitee olemasolu
6. eelnevad infektsioonid
7. kliiniline leid
8. profülaktika

Regionaalhaigla

Neutropeenia ja febriilne NP

Neutropeenia – ANC (absoluutne neutrofiilide hulk) < 1,5 x 10^9/L

- tõsine neutropeenia – ANC < 0,5 x 10^9/L
- sügav neutropeenia – ANC < 0,1 x 10^9/L

Febriilne temperatuur – ühekordsel mõõtmisel oraalselt ≥ 38,3°C või ≥ 38°C püsiv 1h jooksul

Kõrge risk - >7p kestev neutropeenia ja sügav neutropeenia, kaasuvad haigused

Madal risk - <7p kestev neutropeenia, puuduvad kaasuvad haigused

Regionaalhaigla

Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93

Riski hindamine

IDSA kriteeriumid kõrge riskiga patsiendi kohta

- ANC < 0,1 x 10^9/L kestusega > 7 päeva
- Kaasuvad haigused või seisundid (loetelu ei ole lõplik)
  - Ebastabiilne hemodünaamika
  - Suu või GI-trakti mukosiit, mis takistab neelamist või põhjustab ägedat kõhulahtisust
  - Kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus
  - Neuroloogilised sümptomid või teadvusseisundi muutus
  - Intravaskulaarse vahendi infektsioon
  - Uued kolded kopsudes või hüpoksia
  - Kaasuv krooniline kopsuhaigus
- Maksapuudulikkus (transaminaasid > 5 korda kõrgenenud) või neerupuudulikkus (kliirens <30 ml/min)

Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93

Infekt



Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, .e6

Tekitajad

Mixed defects			
Streptococcus pneumoniae	*Pneumocystis jiroveci* (*P. carini*)	*Toxoplasma gondii*	Respiratory viruses:
Staphylococcus aureus	*Aspergillus* species	*Strongyloides stercoralis*	Influenza virus
Haemophilus influenzae	*Candida* species		Parainfluenza
Klebsiella pneumonia	*Cryptococcus neoformans*		Respiratory syncytial virus
Pseudomonas aeruginosa	*Mucorales* (zygomycoses)		Adenovirus
Acinetobacter species	Endemic mycoses (severe systemic dissemination)		Varicella-zoster virus
Enterobacter species			
Stenotrophomonas maltophilia			
Nocardia asteroides complex			
Listeria monocytogenes			
Legionella species			

Regionaalhaigla

Clinical Infectious Diseases 2011;53(8):798–806

Muutuv epidemioloogia



Regionaalhaigla

E. coli 2007 vs 2012 (R - 3. pk tsefalosporiinid)





ECDC

ESBL vs MRSA PERH-s



Regionaalhaigla

Invasiivne ESBL vs MRSA PERH-s



Regionaalhaigla

Olulisimad infektsioonikolded

B

S

H

N

S

U



Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, .e6

Regionaalhaigla



Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, .e6

Hingamisteede infektsioonid

Agent	Mode of infection	Patients at risk
Gramnegative, gram-positive bacteria, *Candida* spp.	Transmission from alimentary/ upper respiratory tract (secondary, septic)	All, especially in combination with severe mucositis
	Transmission from skin via indwelling catheters, prosthetic devices (secondary, septic)	All
S. pneumoniae *Mycoplasma pneumoniae* *Legionella* spp.	Human-to-human transmission, environmental contamination (primary)	All, especially ambulatory patients
Aspergillus spp.	Inhalation of ubiquitous fungal spores (primary)	Neutropenia >10 d, previous allogeneic PBSCT[a], high-dose corticosteroids, dust exposure
Pneumocystis jiroveci	Unknown (activation of latent infection, human-to-human transmission)	Neutropenia >10 d, impaired cellular immunity (esp. HIV)
Cytomegalovirus, *varizella zoster virus*	Reactivation of latent infection	Impaired cellular immunity (esp. HIV, previous allogeneic PBSCT[a])
Respiratory viruses (*respiratory syncytial virus*, *influenza virus*, *parainfluenza virus*, *adenovirus*, *et al.*)	Human-to-human transmission	Unknown
Toxoplasma gondii	Reactivation of latent infection	Impaired cellular immunity (esp. HIV, previous allogeneic PBSCT[a])

Agusti, C. Pulmonary Infection in the Immunocompromised Patient 2009

Regionaalhaigla



Regionaalhaigla

Diagnostika

- Kliiniline veri
- Biokeemilised markerid sh põletikumarkerid
- Uriinianalüüs
- Mikrobioloogilised külvid sh verekülvid
    - tsentraalveenikateetri olemasolul külv nii kateetrist kui ka perifeersest veenist
    - muud külvid vastavalt kliinilisele leiule, kahtlusele
- Rö kopsudest
- KT vajadusel

+ muud spetsiifilised markerid, meetodid vastavalt vajadusele (nt *Aspergilluse* antigeen, SeptiFast)

Regionaalhaigla

Esmane antibakteriaalne ravi kõrge riskiga patsientidel

Monoteraapia tseftasidiimi (*Fortum*), tsefepiimi (*Cefepime*), piperatsilliin-tasobaktaami (*Tazocin*) või septilise šoki korral karbapeneemiga - meropeneem (*Meronem*) või imipeneem (*Tienam*)

Vajadusel lisada

aminoglükosiid, vankomütsiini - resistentsete tekitajate kahtlusel või komplitseeritud kulu (nt ebastabiilse hemodünaamika) korral

Teadaolev ESBL kolonisatsioon - karbapeneem

Oluline AB ravi alustamise kiirus! Ideaalis 1h jooksul

Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93

Esmane antibakteriaalne ravi madala riskiga patsientidel

Empiiriline ravi tsiprofloksatsiini ja amoksitsilliin-klavulaanhape kombinatsiooniga
Saab kasutada suukaudselt
Penitsilliiniallergia korral kombinatsiooniks tsiproflaksatsiin klindamütsiiniga

Oluline patsiendi seisundi jälgimine

Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93

Antibakteriaalne ravi

Ravivastuse hindamine 72-96h möödumisel, korrigeerimine lähtuvalt mikrobioloogiliste külvide tulemustest, patsiendi seisundist

Ravikestus

- mikrobioloogiliselt tõestatud tekitaja puhul sõltuvalt infektsioonikoldest ja vastavalt juhistele
- kuni
  - neutrofiilide hulk >0,5 x 10^9/L
  - patsient on palavikuvaba 48h

Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93

Seeninfektsioonide ravi

Kahtlus seeninfektsioonile jätkuva palaviku korral 4-7 päeva kestnud antibiootikumravi foonil, kui puudub muu infektsioonikolle kõrge riskiga patsientidel

Näidustatud ravi (empiiriline või *preemptive*)

- kaspofungiin
- liposomaalne amfoteritsiin B

- flukonasool?

Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93

Clin Microbiol Infect 2012; 18 (Suppl. 7): 53–67

Regionaalhaigla

Profülaktika

Vajadusel profülaktika fluorokinoloonigа (tsiprofloksatsiin) kõrge riskiga haigetel

- rutiinselt ei soovitata (resistentsuse oht)
- keskustes, kus resistentsus < 20%

Seenevastane profülaktika sõltuvalt riskist ja põhihaigusest

- flukonasool
- posakonasool (*Noxafil*)

Viiruste vastane profülaktika (HSV seropositiivsetel)

- atsikolviir

Gripivastane vaktsineerimine

Pneumokokivastane (ja muu) vaktsineerimine

Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93

Eesti Infektsioonhaiguste Selts

www.esid.ee

Regionaalhaigla

Kokkuvõte

1. Infektsioonid on hematoloogiliste haigustega patsientidel sagedased
2. Olulisim riskifaktor on neutropeenia
3. Tekitajate spekter lai, resistentsuse kasv
4. Õige empiiriline ravi määrava tähtsusega
5. Olulised ka nn tavalised infektsioonid ja nende ravi

Regionaalhaigla