

RAVIPROTSEDUUR ²²³RA-DIKLORIIDIGA (XOFIGO)

Eesnäärmevähi kompleksravis, kui haigus on levinud luudesse ja põhjustab valu, kuid muudes siseelundites kasvajakolded puuduvad, kasutatakse konkreetsest haigusjuhust lähtuvalt ravi ²²³Ra-dikloriidiga (Xofigoga). ²²³Ra-dikloriid koguneb kasvajakollete ümber tekkivasse luukoosse ja põhjustab kasvajarakkude hävimise.

Ravi ajal viibite 1–2 päeva statsionaaris, kus Teie käsutuses on ühekohaline ravipalat WC, valamu ja dušinurgaga, samuti on seal TV, kaabliga ja kaablita internetiühendus, telefon, külmik, mikrolaineahi ja föön.

Ravi näidustuseks on kaugelearenenud eesnäärmevähi luumetastaasid.

Võimalikud kõrvaltoimed:

- vereliistakute ja verelibledede arvu vähenemine;
- kõhulahtisus;
- iiveldus;
- oksendamine.

Raviks ettevalmistus

Ravieelsel konsultatsioonil selgitatakse Teile raviprotseduuriga seonduvaid üksikasju, ravi käiku, loodetavat kasu ja võimalikke kõrvaltoimeid ning antakse ravieelsed ja -järgsed individuaalsed juhised.

Ravi järgselt vältige lapse eostamist vähemalt kuue kuu jooksul.

Luumurd või seljaaju kompressioon stabiliseeritakse enne ravi.

Ravi planeerimise järgus tehakse vereanalüüsid vereloome ja neerude seisundi hindamiseks ning teostatakse kogu keha luustiku stsintigraafiline uuring.

Teavitage arsti kaltsiumi, fosfaatide või D-vitamiini tarvitamisest või eelnenud keemiaravist, vajadusel tuleb ravimite võtmine katkestada. Samuti teavitage arsti soolestiku pikaajalisest põletikust, sest see võib ravi käigus süveneda.

Ravi teostamine

Tavaliselt teostatakse kuus ravimi manustamist 4-nädalase vaheajaga.

Ravipäeval selgitatakse veelkord raviprotseduuriga seonduvaid detaile, protseduuri käiku ja raviga seotud kiirgusohutuse nõudeid ning võetakse anamnees ja vereanalüüsid. Raviprotseduuri eel tuleb Teil allkirjastada nõusolekublankett.

4 tundi enne ja **1 tund** pärast raviprotseduuri ei tohi süüa.

Enne raviprotseduuri ja pärast ravipreparaadi manustamist on soovitatav rohke vedeliku tarbimine (2–3 liitrit) neerude kaitsmiseks ja kehas seostumata ravipreparaadi kiiremaks väljutamiseks.

Ravipreparaat süstitakse aeglaselt 1 minuti jooksul veeni.

Pärast raviprotseduuri:

- tarbige rohkelt vedelikku, et kehas seostumata ravipreparaat kiiremini väljuks ja tühjendage põit sageli, et vähendada kiirguskoormust põiele;
- soovitatav on sage kätepesu ning hoolikas isiklik hügieen;
- vähemalt kuue kuu jooksul kasutage efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid, et vältida lapse eostamist;
- ravi järel jääte arstlikule jälgimisele, Teile antakse täitmiseks visuaalne analoog-valuskaala.

Täiendavate selgituste saamiseks palume helistada 617 1221 või 617 1216 või 617 1085.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19
13419 Tallinn

www.regionaalhaigla.ee
info@regionaalhaigla.ee