




ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПО ЗАБОРУ ПРОБЫ КАЛА (пробирка с формалином)

При подозрении на наличие кишечных паразитов (*St-Parasites-m*) Вам назначают исследование пробы кала. При подозрении на наличие гельминтов (глистов) исследование кала рекомендуется повторить 3 раза с 2–4-дневными интервалами, поскольку отрицательный ответ, полученный однократно, еще не является подтверждением отсутствия паразитов.

Решение о необходимости исследования принимает Ваш врач.

Направление и пробирку для забора материала Вам выдаст назначивший исследование врач, сестра или работник лаборатории.



Подготовка к исследованию:

- питайтесь обычным образом;
- в течение 1 недели перед забором пробы не принимайте антибиотиков и противодиарейных (противопоносных) препаратов.

Забор кала для исследования кишечных паразитов:

- в пробирке находится 10% раствор формалина*, который является консервантом;
- откройте пробирку, не прикасайтесь к внутренней поверхности пробирки и ее крышки;
- при дефекации старайтесь, чтобы кал не соприкасался с водой и мочой (можно использовать, например, одноразовую тарелку);
- с помощью ложечки, закрепленной на крышке пробирки, возьмите пробу кала объемом, равным 1/2 объема имеющегося в пробирке консерванта (10% раствор формалина*);
- закройте пробирку, убедившись, что она не подтекает;
- слегка встряхните пробирку 5–6 раз, чтобы забранная проба кала смешалась с раствором консерванта;
- напишите на контейнере сбоку (не на крышке!) свои **имя, фамилию и личный код**;
- укажите на направлении **дату и время** забора пробы.



В течение дня отнесите пробирку с полученным материалом в регистратуру лаборатории.

Если это невозможно, то принесите собранную пробу утром следующего дня. Храните контейнер с пробой кала при температуре +2...+8 °С (в холодильнике).

Подробности о местонахождении лаборатории и часах работы можно найти на странице Северо-Эстонской региональной больницы www.regionaalhaigla.ee, телефон для справок 617 1300.



* Первая помощь в случае контакта с формалином

При попадании на кожу – незамедлительно снять запачканную одежду и промыть загрязненный участок кожи большим количеством воды с мылом.

При попадании в глаза – в течение 10–15 минут промывать глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.

При попадании в рот – пить много воды и обратиться к врачу. NB! Не пытайтесь вызвать рвоту!

Составлено: Северо-Эстонская региональная больница

ул. Сютисте, 19

13419 ТАЛЛИНН